

热应激对不同品种（系）青年肉牛生产性能、营养物质表观消化率及血液生化指标的影响

蒲启建 王之盛* 彭全辉 张 灿 景小平 胡 瑞 邹华围

(四川农业大学动物营养研究所, 牛低碳养殖与安全生产重点实验室, 雅安 625014)

摘 要: 本试验旨在研究热应激对不同品种（系）青年肉牛生产性能、营养物质表观消化率及血液生化指标的影响, 探究不同品种（系）肉牛的耐热性差异。选取体重相近[(185.89±14.02) kg]、健康的青年西杂牛（西门塔尔×宣汉黄牛）、地方黄牛（宣汉黄牛）和犏牛（娟姗牛×麦洼牦牛）各 6 头为研究对象, 试验期间不同品种（系）的青年肉牛饲喂相同饲料。试验时间为 2015 年 4—9 月, 预试期 7 d, 正试期 180 d。结果表明: 1) 试验牛舍 5—8 月温湿度指数 (THI) 高于 72, 属于热应激期, 且显著高于 4 (热应激发生前) 和 9 月 (热应激发生后) ($P<0.05$); 热应激环境导致各试验牛呼吸频率和直肠温度显著升高 ($P<0.05$)。试验期间犏牛呼吸频率和直肠温度显著高于西杂牛和地方黄牛 ($P<0.05$)。2) 热应激期内西杂牛、地方黄牛和犏牛单位体重干物质采食量均有不同程度降低, 以 6 月为最低, 均较 4 月显著降低 ($P<0.05$), 且降低幅度为犏牛>西杂牛>地方黄牛。西杂牛、地方黄牛和犏牛的平均日增重 (ADG) 均在 6 月最低, 分别较 4 月降低了 27.62% ($P<0.05$)、10.81% ($P>0.05$) 和 46.15% ($P<0.05$); 西杂牛的 ADG 在 4—7 月显著高于犏牛 ($P<0.05$)。西杂牛和犏牛的料重比(F/G)以 6 月为最高, 分别较 4 月升高了 63.01% ($P<0.05$) 和 89.03% ($P<0.05$); 地方黄牛的 F/G 在 9 月最高, 较 4 月升高了 53.12% ($P<0.05$)。3) 热应激期内西杂牛、地方黄牛和犏牛的粗蛋白质 (CP) 表观消化率均有不同程度降低, 且 7 月均较 4 月显著降低 ($P<0.05$); 西杂牛 7 月的粗脂肪 (EE) 表观消化率较 4 月显著降低 ($P<0.05$), 而热应激对地方黄牛和犏牛的 EE 表观消化率无显著影响 ($P>0.05$); 热应激期内犏牛中性洗涤纤维 (NDF) (6 月) 和酸性洗涤纤维 (ADF) 的表观消化率 (5—8 月) 较热应激发生前显著降低 ($P<0.05$); 热应激期内西杂牛和犏牛钙 (Ca) (西杂牛: 6—8 月; 犏牛: 5—8 月) 和磷 (P) 的表观消化率 (西杂牛: 6—7 月; 犏牛: 5—8 月) 较热应激发生前显著降低 ($P<0.05$)。试验期间, 不同品种（系）牛的 CP 表观消化率无显著差异 ($P>0.05$), 西杂牛和地方黄牛的 EE 表观消化率显著高于犏牛 ($P<0.05$), 地方黄牛的 ADF 表观消化率显著高于西杂牛和犏牛 ($P<0.05$), 西杂牛和地方黄牛的 P 表观消化率显著高于犏牛 ($P<0.05$)。此外, 5—9 月地方黄牛的 Ca 表观消化率显著高于犏牛 ($P<0.05$)。4) 西杂牛、地方黄牛和犏牛血清中葡萄糖 (GLU) 浓

收稿日期: 2017-02-20

基金项目: 国家肉牛牦牛产业技术体系资金资助 (CARS-38)

作者简介: 蒲启建(1990-), 男, 四川成都人, 硕士研究生, 从事反刍动物营养与饲料科学研究。E-mail: penqiji@live.com

*通信作者: 王之盛, 教授, 博士生导师, E-mail: zswangsicau@126.com

度均以 6 月最低,较 4 月分别降低了 16.82% ($P<0.05$)、12.82% ($P>0.05$) 和 15.90% ($P<0.05$);
热应激期间各试验牛血清中非酯化脂肪酸 (NEFA) 浓度均以 7 月最低,显著低于 4 月 ($P<0.05$);
试验期间西杂牛和地方黄牛血清中尿素氮 (UN) 浓度随年龄的增大呈先升高后降低变化,而犏
牛血清中 UN 浓度则持续升高;6—9 月各试验牛血清肌酐 () CRE 浓度均显著高于 4、5 月 (P
 <0.05),且 7—9 月犏牛血清 CRE 浓度显著高于地方黄牛 ($P<0.05$)。综上所述,热应激导致不
同品种 (系) 青年肉牛生产性能降低、饲料营养物质消化率降低,地方黄牛的耐热应激能力强于
西杂牛和犏牛,犏牛对热应激最敏感。

关键词: 热应激; 肉牛; 生产性能; 营养物质表观消化率; 血液生化指标

中图分类号: S816

文献标识码: A

文章编号:

随着我国人们生活水平的提高,消费者对牛肉的消费需求逐年增加,然而国内牛肉却因牛源
不足连续减产。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要分区域推
进现代草业和草食畜牧业发展。然而,当前牧区牲畜超载过牧越来越严重,草畜矛盾越来越尖锐。
我国南方地区因其气候优势,草场的单位面积产量高、开发潜力较大,肉牛养殖有着可观的发展
前景。“牧繁农育”的提出,为缓解牧区草畜矛盾、提高农区肉牛产量提供了解决办法。但是,
在我国南方高温高湿环境下牛极易出现热应激反应^[1],严重降低其生产性能^[2-3],给养殖业造成巨
大损失^[4]。国内外常将环境温度和湿度相结合即温湿度指数 (temperature humidity index, THI)
来评价外界环境,且大量研究认为当 THI 大于 72 时,奶牛即处于热应激状态^[5-7]。

牛的耐热性与品种 (系)、生产性能有密切关系^[8-9]。西杂牛是为改善我国地方黄牛生产性能
而与西门塔尔牛杂交的改良种;黄牛是我国固有牛种,其养殖数量在我国牛类中居首,其适应能
力强,耐粗饲;犏牛则是青藏高原地区为改善牦牛生产性能而与其他普通牛种杂交的品种,能适
应高海拔、低气压和冷季长的生态环境。上述 3 种肉牛在我国农区和牧区肉牛养殖中有着举足轻
重的地位。目前关于反刍动物热应激的研究主要集中于奶牛,关于肉牛热应激的相关研究还相对
较少,因此探究西杂牛、地方黄牛和犏牛的耐热能力对南方高温高湿地区肉牛养殖具有重要意义。
鉴于此,本试验选用西杂牛 (西门塔尔×宣汉黄牛)、地方黄牛 (宣汉黄牛) 和犏牛 (娟珊牛×麦
洼牦牛) 3 种肉牛,在南方地区 (四川省雅安市) 经 4—9 月连续 6 个月饲养,通过生产性能、营
养物质表观消化率、血液生化指标等考察热应激对不同品种 (系) 肉牛的影响,为我国南方地区
肉牛养殖品种的选择提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验动物与试验设计

本试验于 2015 年 4—9 月在四川农业大学动物营养研究所试验场（海拔 598 m）进行。选取体重相近[(185.89±14.02) kg]、健康的青年西杂牛（西门塔尔×宣汉黄牛）、地方黄牛（宣汉黄牛）、犏牛（麦洼牦牛×娟姗牛）去势公牛各 6 头，分为 3 个组，即西杂牛组、地方黄牛组和犏牛组，每组 6 个重复，每个重复 1 头牛。试验期间不同品种（系）的青年肉牛饲喂相同饲料。西杂牛和地方黄牛购于四川省达州市宣汉县（平均海拔 780 m），犏牛购于四川省阿坝藏族羌族自治州红原县（平均海拔 3 500 m）。

1.2 饲养管理与饲料

所有牛只均舍饲饲养，预试期 7 d，正试期 180 d。饲养开始前，对试验牛进行驱虫处理。每天 09:00 和 15:00 定时饲喂 2 次，以预试期测定的采食量为基础，自由采食和饮水，所有余料在第 2 天晨饲前记录。

根据中国《肉牛饲养标准》(NY/T 815—2004)中 200 kg 体重、日增重 800 g 肉牛营养推荐值，以玉米、豆粕、小麦麸、菜籽粕等为精料，以稻草、白酒糟为粗料设计配方。饲料组成及营养水平见表 1。

表 1 饲料组成及营养水平（风干基础）

Table 1 Composition and nutrient levels of the diet (air-dry basis)		%
项目	Items	含量 Content
原料	Ingredients	
玉米	Corn	18.75
麦麸	Wheat bran	6.00
豆粕	Soybean meal	1.50
菜籽饼	Rapeseed cake	2.70
白酒糟	White distilled grain	30.00
稻草	Rice straw	40.00
碳酸钙	CaCO ₃	0.45
小苏打	NaHCO ₃	0.15
食盐	NaCl	0.15
预混料	Premix ¹⁾	0.30

合计 Total	100.00
营养水平 Nutrient levels ²⁾	
综合净能 NE _{mf} / (MJ/kg)	4.82
粗蛋白质 CP	12.61
粗脂肪 EE	2.99
中性洗涤纤维 NDF	38.95
酸性洗涤纤维 ADF	28.84
钙 Ca	0.60
磷 P	0.33

¹⁾ 预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of the diet: VA 3 300 IU, VD 880 IU, VE 60 IU, Cu (as copper sulfate) 10 mg, Fe (as ferrous sulfate) 50 mg, Mn (as manganese sulfate) 20 mg, Zn (as zinc sulfate) 30 mg, I (as potassium iodide) 0.50 mg, Se (as sodium selenite) 0.10 mg, Co (as cobalt chloride) 0.1 mg。

²⁾ 综合净能根据我国《肉牛饲养标准》(NY/T 815—2004) 计算得出, 其余为实测值。NE^{mf} was calculated according to the Chinese *Feeding Standard of Beef Cattle* (NY/T 815—2004), while the other nutrient levels were measured values.

1.3 样品采集和指标测定

1.3.1 样品采集

试验期内, 在牛舍前、中、后部距地面 1.5 m 高处各悬挂 1 支干湿温度计, 于每天 08:00、11:00、14:00 和 17: 00 记录牛舍的干球温度 (Td) 和湿球温度 (Tw), 利用下列公式计算 THI。

$$THI=0.72\times (Td+Tw) +40.6^{[10]}。$$

参考 Johnson 等^[11]的方法每 10 d 分别于 08: 00 和 14: 00 测量各组肉牛直肠温度并记录呼吸频率。

试验期间每天记录各试验牛精料、粗料实际饲喂量, 并计算干物质采食量 (DMI); 根据 DMI 和体重计算单位体重 DMI。

分别在正式试验第 0 天 (正式试验开始前)、第 30 天、第 60 天、第 90 天、第 120 天、第 150 天、第 180 天晨饲前空腹称重, 计算各试验牛的平均日增重 (ADG) 并计算料重比(F/G); 并由颈静脉采集试验牛血液 15 mL, 静置 30 min 后 4 000 r/min 离心 15 min 制备血清, -20 ℃保存待测血液生化指标。

试验期内每 30 d 采集 1 次饲料样，-20 ℃保存。分别在正式试验第 0 天、第 30 天、第 60 天、第 90 天、第 120 天、第 150 天连续 7 d 08:00、14:00、20:00 采集各试验牛鲜粪样 100 g 左右，于-20 ℃保存，待 7 d 粪样收集完全后混匀，按粪样重量的 5%加入浓度为 10%的稀硫酸固氮，-20 ℃保存待测^[12]。

1.3.2 指标测定

参照张丽英^[13]的方法测定饲粮及粪样中干物质（DM）、粗蛋白质（CP）、粗纤维（CF）、中性洗涤纤维（NDF）、酸性洗涤纤维（ADF）、钙（Ca）和磷（P）的含量。采用内源指示剂[酸不溶灰分（AIA）]法测定试验牛的营养物质表观消化率^[12]。

$$\text{某营养物质表观消化率(\%)}=100-100\times[(F_2/F_1)\times(A_1/A_2)]$$

式中： A_1 为饲粮中 AIA 含量（%）； A_2 为粪中 AIA 含量（%）； F_1 为饲粮中该营养物质含量（%）； F_2 为粪中该营养物质含量（%）。

采用全自动生化分析仪（AUTOLAB PM-4000，意大利）通过比色法测定血清中葡萄糖（GLU）、甘油三酯（TG）、尿素氮（UN）、肌酐（CRE）的浓度；采用酶联免疫吸附测定（ELISA）法测定血清中非酯化脂肪酸（NEFA）的浓度，试剂盒购于南京建成生物工程公司，具体操作方法参考说明书进行。

1.4 数据分析

试验数据经 Excel 2016 初步分析后，用 SPSS 19.0 统计软件进行单因素方差分析（one-way ANOVA）程序方差分析，有显著差异（ $P<0.05$ ）时，以 Duncan 氏法进行多重比较，结果以平均值±标准差表示。

2 结果与分析

2.1 牛舍 THI 与肉牛直肠温度、呼吸频率

试验期间牛舍 THI 指数变化见表 2 和图 1。试验期间牛舍内温度逐渐升高，THI 也逐渐升高，5—8 月牛舍 THI 显著高于 4 月和 9 月（ $P<0.05$ ）。根据 THI 将整个试验阶段分为热应激发生前（4 月， $THI<72$ ）、热应激期（5—8 月， $THI\geq72$ ）和热应激结束后（9 月， $THI<72$ ）。

表 2 试验期间牛舍 THI 变化

Table 2 The THI change of barn during experimental period

项目 Items	4 月 April	5 月 May	6 月 June	7 月 July	8 月 August	9 月 September
干球温度 Td/℃	22.83±3.11	25.97±1.93	27.68±1.43	28.02±1.97	26.16±1.32	23.90±1.04
湿球温度 Tw/℃	18.11±2.01	20.99±1.54	23.45±1.62	23.57±1.42	23.40±1.15	19.60±0.74

温湿度指数 THI	70.08±3.53 ^a	74.41±2.18 ^c	77.41±1.90 ^e	77.74±2.12 ^e	76.28±1.20 ^d	71.92±0.95 ^b
-----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

同行数据肩标无字母或相同小写字母表示差异不显著 ($P>0.05$), 不同小写字母表示差异显著 ($P<0.05$)。

In the same row, values with the same or no small letter superscripts mean no significant difference ($P>0.05$), while with different small letter superscripts mean significant difference ($P<0.05$)。




图1 试验期间牛舍 THI

Fig.1 The THI of barn during experimental period

热应激对肉牛呼吸频率和直肠温度的影响见表 3。

各试验牛只试验期间呼吸频率随 THI 的升高而升高, 湿热应激期内各试验牛呼吸频率较湿热应激发生前显著升高 ($P<0.05$)。试验期间犏牛呼吸频率显著高于西杂牛和地方黄牛 ($P<0.05$), 而西杂牛呼吸频率显著高于地方黄牛 ($P<0.05$)。

各试验牛直肠温度均是在热应激期中的 6 月开始显著升高 ($P<0.05$)。西杂牛、地方黄牛和犏牛均以 7 月直肠温度最高, 分别较热应激发生前升高了 1.15% ($P<0.05$)、0.84% ($P<0.05$) 和 1.98% ($P<0.05$), 而热应激结束后直肠温度均较 7 月显著降低 ($P<0.05$)。试验期间犏牛直肠温度显著高于西杂牛和地方黄牛 ($P<0.05$)。

不同月份 THI 和各试验牛只直肠温度、呼吸频率的变化表明西杂牛、地方黄牛和犏牛在 5—8 月处于热应激状态。

表 3 热应激对肉牛呼吸频率和直肠温度的影响

Table 3 Effects of heat stress on respiratory rate and rectal temperature of beef cattle

项目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
Items	April	May	June	July	August	September

呼吸频率 Respiratory rate/（次/min）						
西杂牛 Simmental crossbred cattle	42.28±2.06 ^{Ba}	53.11±1.66 ^{Bbc}	56.56±1.29 ^{Be}	53.89±0.72 ^{Bcd}	54.89±0.96 ^{Bd}	51.83±0.89 ^{Bb}
地方黄牛 Indigenous yellow cattle	37.39±3.19 ^{Aa}	40.89±0.98 ^{Ab}	47.78±2.16 ^{Ad}	44.94±1.61 ^{Ac}	44.28±1.93 ^{Ac}	42.56±1.33 ^{Abc}
犏牛 Cattle yak	53.89±0.91 ^{Ca}	62.78±1.36 ^{Cb}	71.22±2.67 ^{Cd}	72.78±1.8 ^{Cd}	68.61±2.04 ^{Cc}	64.56±1.03 ^{Cb}
直肠温度 Rectal temperature/℃						
西杂牛 Simmental crossbred cattle	38.13±0.09 ^{Aa}	38.17±0.06 ^{Aa}	38.31±0.10 ^{Ab}	38.57±0.10 ^{Bc}	38.41±0.08 ^{Bb}	38.37±0.05 ^{Bb}
地方黄牛 Indigenous yellow cattle	38.02±0.10 ^{Aa}	38.11±0.05 ^{Aab}	38.24±0.09 ^{Ac}	38.34±0.11 ^{Ae}	38.27±0.04 ^{Ade}	38.16±0.05 ^{Abc}
犏牛 Cattle yak	38.47±0.04 ^{Ba}	38.53±0.09 ^{Ba}	38.85±0.16 ^{Bc}	39.23±0.07 ^{Cd}	38.96±0.07 ^{Cc}	38.71±0.03 ^{Cb}

同行数据肩标无字母或相同小写字母表示差异不显著 ($P>0.05$)，不同小写字母表示差异显著 ($P<0.05$)。

同列数据肩标无字母或相同小写字母表示差异不显著 ($P>0.05$)，不同小写字母表示差异显著 ($P<0.05$)。下表同。

In the same row, values with the same or no small letter superscripts mean no significant difference($P>0.05$), while with different small letter superscripts mean significant difference ($P<0.05$). In the same column ,values with the same or no capital letter superscripts mean no significant difference ($P>0.05$) , while with different capital letter superscripts mean significant difference ($P<0.05$) . The same as below.

2.2 热应激对肉牛生产性能的影响

热应激对肉牛生产性能的影响见表 4。

试验期间随着试验牛年龄的增大，西杂牛、地方黄牛和犏牛 DMI 均有不同程度升高，9 月相对于 4 月分别升高了 65.01% ($P<0.05$)、37.83% ($P<0.05$) 和 33.89% ($P<0.05$)；9 月时西杂牛 DMI 显著高于地方黄牛和犏牛 ($P<0.05$)。热应激期内西杂牛、地方黄牛和犏牛单位体重 DMI 均有不同程度降低，且以 6 月为最低，较热应激发生前分别降低了 11.17% ($P<0.05$)、8.83% ($P<0.05$) 和 16.15% ($P<0.05$)；犏牛单位体重 DMI 的降低较西杂牛和地方黄牛发生早：与热应激发生前相比，西杂牛和地方黄牛单位体重 DMI 在 6 月开始显著降低 ($P<0.05$)，而犏牛在 5 月即开始显著降低 ($P<0.05$)。

各试验牛 ADG 在 6 月最低，其中西杂牛 6 月的 ADG 较热应激发生前降低了 27.62% ($P<0.05$)，地方黄牛 6 月的 ADG 较热应激发生前降低了 10.81% ($P>0.05$)，犏牛 6 月的 ADG 较热应激发生前降低了 46.15% ($P<0.05$)；在整个试验期内，西杂牛的 ADG 均高于地方黄牛和犏牛，且在 4—7 月与犏牛的差异达到显著水平 ($P<0.05$)。

热应激期内西杂牛和犏牛的 F/G 均有不同程度升高，且以 6 月为最高，分别较热应激发生前升高了 63.01% ($P<0.05$) 和 89.03% ($P<0.05$)；试验期间地方黄牛 F/G 随年龄的增大逐渐升高，9 月的 F/G 较热应激发生前升高了 53.12% ($P<0.05$)；在整个试验期内，犏牛 F/G 均高于西杂牛和地方黄牛，且 5—7 月与西杂牛和地方黄牛的差异达到显著水平 ($P<0.05$)。

160

表 4 热应激对肉牛生产性能的影响

161

Table 4 Effects of heat stress on performance of beef cattle

项目 Items	4 月 April	5 月 May	6 月 June	7 月 July	8 月 August	9 月 September
干物质采食量 DMI/kg						
西杂牛 Simmental crossbred cattle	6.23±0.38 ^a	7.35±0.44 ^b	7.57±0.32 ^{Bb}	8.45±0.43 ^{Bc}	8.99±0.52 ^d	10.28±0.57 ^{Be}
地方黄牛 Indigenous yellow cattle	6.37±0.47 ^a	7.00±0.74 ^{ab}	7.11±0.68 ^{ABab}	7.90±0.87 ^{ABbc}	8.34±1.00 ^c	8.78±1.26 ^{Ac}
犏牛 Cattle yak	6.58±0.30 ^a	6.69±0.46 ^a	6.75±0.52 ^{Aa}	7.38±0.43 ^{Ab}	8.15±0.58 ^c	8.81±0.54 ^{Ad}
单位体重干物质采食量 DMI per body weight/%						
西杂牛 Simmental crossbred cattle	3.49±0.27 ^b	3.48±0.20 ^{Bb}	3.10±0.23 ^a	3.11±0.10 ^a	3.05±0.21 ^{Aa}	3.35±0.15 ^b
地方黄牛 Indigenous yellow cattle	3.51±0.11 ^b	3.41±0.09 ^{ABab}	3.20±0.18 ^a	3.35±0.19 ^{ab}	3.37±0.16 ^{Bab}	3.36±0.22 ^{ab}
犏牛 Cattle yak	3.53±0.21 ^c	3.16±0.16 ^{ABab}	2.96±0.13 ^a	3.12±0.27 ^{ab}	3.23±0.22 ^{ABab}	3.25±0.18 ^b
平均日增重 ADG/kg						
西杂牛 Simmental crossbred cattle	1.05±0.07 ^{Bb}	1.04±0.10 ^{Bb}	0.76±0.11 ^{Ba}	0.90±0.14 ^{Bab}	0.91±0.18 ^{ab}	1.03±0.17 ^b
地方黄牛 Indigenous yellow cattle	0.74±0.19 ^A	0.81±0.28 ^B	0.66±0.23 ^B	0.74±0.28 ^{AB}	0.71±0.24	0.71±0.29
犏牛 Cattle yak	0.78±0.07 ^{Ab}	0.53±0.13 ^{Aa}	0.42±0.09 ^{Aa}	0.53±0.09 ^{Aa}	0.66±0.17 ^{ab}	0.62±0.14 ^{ab}
料重比 F/G						
西杂牛 Simmental crossbred cattle	6.11±0.68 ^{Aa}	7.05±0.81 ^{Aab}	9.96±1.43 ^{Ac}	9.45±1.56 ^{Abc}	9.87±2.43 ^c	9.81±0.21 ^c
地方黄牛 Indigenous yellow cattle	7.70±0.35 ^{Ba}	8.92±2.88 ^{Aab}	10.83±2.64 ^{ABab}	11.04±1.57 ^{ABab}	11.69±2.27 ^b	11.79±2.31 ^b
犏牛 Cattle yak	8.57±0.96 ^{Ba}	12.57±1.08 ^{Bab}	16.20±3.18 ^{Bb}	14.38±2.07 ^{Bab}	12.71±2.16 ^{ab}	13.24±3.68 ^{ab}

162 2.3 热应激对肉牛营养物质表观消化率的影响

163 由表 5 可知，热应激期内西杂牛、地方黄牛和犏牛的 CP 表观消化率均有不同程度降低，且
164 以 7 月最低，分别较热应激发生前降低了 10.30% ($P<0.05$)、10.17% ($P<0.05$) 和 9.77% ($P<$
165 0.05)；西杂牛 7 月的 EE 表观消化率较热应激发生前显著降低 ($P<0.05$)，而热应激对地方黄牛
166 和犏牛的 EE 表观消化率无显著影响 ($P>0.05$)；热应激期内犏牛中性洗涤纤维 (NDF) 和酸性
167 洗涤纤维 (ADF) 的表观消化率均有不同程度降低，其 NDF 的表观消化率在 6 月显著低于热应
168 激发生前 ($P<0.05$)，ADF 的表观消化率在整个热应激期内均显著低于热应激发生前 ($P<0.05$)；
169 热应激期内西杂牛和犏牛钙 (Ca) 的表观消化率均有不同程度降低，其中西杂牛 Ca 的表观消化
170 率在 6—8 月显著低于热应激发生前 ($P<0.05$)，犏牛 Ca 的表观消化率在整个热应激期内均显著
171 低于热应激发生前 ($P<0.05$)；热应激期内西杂牛和犏牛磷 (P) 的表观消化率均有不同程度降
172 低，其中西杂牛 P 的表观消化率在 6—7 月显著低于热应激发生前 ($P<0.05$)，犏牛 P 的表观消
173 化率在整个热应激期内均显著低于热应激发生前 ($P<0.05$)。试验期间不同品种 (系) 牛的 CP
174 表观消化率无显著差异 ($P>0.05$)，西杂牛和地方黄牛的 EE 表观消化率显著高于犏牛 ($P<0.05$)，
175 地方黄牛的 ADF 表观消化率均显著高于西杂牛和犏牛 ($P<0.05$)，西杂牛和地方黄牛的 P 表观
176 消化率显著高于犏牛 ($P<0.05$)；5—9 月地方黄牛的 Ca 表观消化率显著高于犏牛 ($P<0.05$)。

chinaXiv:201711.01829v1

177 表 5 热应激对肉牛营养物质表观消化率的影响

178 Table 5 Effects of heat stress on nutrient apparent digestibility of beef cattle %

项目 ems	4 月 April	5 月 May	6 月 June	7 月 July	8 月 August
蛋白质 CP					
西杂牛 Simmental crossbred cattle	69.23±3.17 ^c	68.17±2.91 ^{bc}	64.91±2.92 ^{ab}	62.10±3.08 ^a	63.24±3.16 ^a
地方黄牛 Indigenous yellow cattle	68.70±3.69 ^c	67.90±3.80 ^{bc}	64.79±3.90 ^{abc}	61.71±3.99 ^a	63.24±3.92 ^{ab}
犏牛 Cattle yak	69.17±1.63 ^c	68.37±1.72 ^c	65.09±1.87 ^b	62.41±1.85 ^a	63.40±1.81 ^{ab}
脂肪 EE					
西杂牛 Simmental crossbred cattle	86.32±1.51 ^{Cbc}	86.94±1.57 ^{Bc}	86.70±1.36 ^{Bc}	84.20±1.43 ^{Ba}	84.82±1.13 ^{Bab}
地方黄牛 Indigenous yellow cattle	83.11±2.25 ^B	84.65±1.69 ^B	84.48±1.51 ^B	83.29±1.37 ^B	83.74±1.20 ^B
犏牛 Cattle yak	75.51±3.10 ^A	77.63±2.99 ^A	77.48±3.31 ^A	75.14±3.33 ^A	76.60±3.44 ^A
中性洗涤纤维 NDF					
西杂牛 Simmental crossbred cattle	65.41±3.20	63.73±3.19	63.38±2.87 ^{AB}	63.59±3.09	64.31±3.31 ^{AB}
地方黄牛 Indigenous yellow cattle	67.71±4.54	67.91±4.61	67.38±4.29 ^B	68.09±4.38	68.28±4.16 ^B
犏牛 Cattle yak	66.52±2.62 ^b	65.28±2.94 ^{ab}	62.75±2.27 ^{Aa}	63.59±2.96 ^{ab}	63.69±2.35 ^{Aab}
酸性洗涤纤维 ADF					
西杂牛 Simmental crossbred cattle	57.92±3.12 ^A	56.50±2.13 ^A	56.38±2.79 ^A	55.23±2.85 ^A	55.19±3.49 ^A
地方黄牛 Indigenous yellow cattle	63.35±5.87 ^B	63.78±5.73 ^B	64.91±5.29 ^B	63.93±5.69 ^B	63.79±5.68 ^B
犏牛 Cattle yak	59.59±2.53 ^{ABc}	55.68±1.59 ^{Ab}	54.72±2.05 ^{Aab}	52.52±2.61 ^{Aa}	53.37±2.61 ^{Aab}
钙 Ca					
西杂牛 Simmental crossbred cattle	45.75±3.85 ^b	44.95±3.65 ^{Bb}	29.68±3.98 ^{Aa}	28.1±4.23 ^{Aa}	26.14±5.79 ^{Aa}
地方黄牛 Indigenous yellow cattle	47.45±4.69	45.72±4.95 ^B	44.07±3.18 ^B	43.31±4.18 ^B	43.3±4.16 ^B
犏牛 Cattle yak	45.21±1.36 ^c	33.18±3.40 ^{Ab}	25.23±4.65 ^{Aa}	24.78±3.97 ^{Aa}	24.78±4.01 ^{Aa}
磷 P					
西杂牛 Simmental crossbred cattle	52.12±3.80 ^{Cbc}	49.9±3.75 ^{Bab}	46.19±3.68 ^{Ba}	46.87±1.90 ^{Ba}	52.67±1.12 ^{Cbc}
地方黄牛 Indigenous yellow cattle	45.06±2.93 ^B	44.52±6.37 ^B	46.91±2.99 ^B	42.33±4.03 ^B	45.26±4.99 ^B
犏牛 Cattle yak	39.69±0.74 ^{Ad}	31.26±2.30 ^{Abc}	22.83±1.61 ^{Aa}	27.01±2.42 ^{Aa}	29.87±1.05 ^{Ab}

179 2.4 热应激对肉牛血液生化指标的影响

180 由表 6 可知，热应激期内西杂牛、地方黄牛和犏牛血清中 GLU 浓度均先降低后升高，且均
181 以 6 月最低，较热应激发生前分别降低了 16.82% ($P<0.05$)、12.82% ($P>0.05$) 和 15.90% ($P<$
182 0.05)。试验期间各试验牛血清中 TG 浓度随年龄的增大逐渐升高，热应激结束后血清中 TG 浓度
183 显著高于热应激发生前 ($P<0.05$)，且热应激结束后西杂牛血清中 TG 浓度显著高于地方黄牛和
184 犏牛 ($P<0.05$)。此外，热应激期间各试验牛血清中 NEFA 浓度均有不同程度降低，且以 7 月最
185 低，显著低于热应激发生前 ($P<0.05$)；热应激结束后西杂牛和犏牛血清中 NEFA 浓度较 8 月显
186 著升高 ($P<0.05$)，而地方黄牛 NEFA 浓度仍维持在较低水平。试验期间西杂牛和地方黄牛血清
187 中 UN 浓度随年龄的增大呈先升高后降低变化，而犏牛血清中 UN 浓度则持续升高。西杂牛 7、8
188 月血清中 UN 浓度较热应激发生前显著升高 ($P<0.05$)；地方黄牛 6、7 月血清中 UN 浓度显著高

于热应激发生前和热应激结束后 ($P<0.05$)；犏牛热应激结束后血清中 UN 浓度较热应激发生前升高了 93.75% ($P<0.05$)。6—9 月各试验牛血清 CRE 浓度均显著高于 4、5 月 ($P<0.05$)，且 7—9 月犏牛血清 CRE 浓度显著高于地方黄牛 ($P<0.05$)。

表 6 热应激对肉牛血液生化指标的影响

Table 6 Effects of heat stress on blood biochemical indices of beef cattle

项目 Items	4 月 April	5 月 May	6 月 June	7 月 July	8 月 August	9 月 September
葡萄糖 GLU/(mmol/L)						
西杂牛 Simmental crossbred cattle	3.27±0.22 ^b c	3.03±0.41 ^b	2.72±0.33 ^a	3.07±0.12 ^b	3.49±0.28 ^{bc}	3.57±0.19 ^c
地方黄牛 Indigenous yellow cattle	3.12±0.07 ^a bc	3.01±0.40 ^{ab}	2.72±0.24 ^a	3.00±0.48 ^{ab}	3.41±0.32 ^{bc}	3.55±0.27 ^c
犏牛 Cattle yak	3.27±0.16 ^b	2.82±0.2 ^a	2.75±0.27 ^a	3.26±0.14 ^b	3.50±0.16 ^{bc}	3.67±0.20 ^c
甘油三酯 TG/(mmol/L)						
西杂牛 Simmental crossbred cattle	0.19±0.05 ^a	0.20±0.06 ^a	0.20±0.06 ^a	0.22±0.05 ^a	0.24±0.07 ^a	0.31±0.05 ^{Bb}
地方黄牛 Indigenous yellow cattle	0.18±0.04 ^a b	0.17±0.02 ^a	0.17±0.02 ^a	0.19±0.02 ^{ab}	0.21±0.02 ^b	0.26±0.02 ^{Ac}
犏牛 Cattle yak	0.18±0.03 ^a	0.18±0.02 ^a	0.18±0.02 ^a	0.20±0.03 ^{ab}	0.22±0.03 ^b	0.25±0.03 ^{Ac}
非酯化脂肪酸 NEFA/(mmol/L)						
西杂牛 Simmental crossbred cattle	828.02±72. 9 ^d	833.23±42. 18 ^{Cd}	693.78±48.5 Cc	296.15±40.5 5 ^{Aa}	329.26±68.6 8 ^{Aa}	487.56±30.2 7 ^{Bb}
地方黄牛 Indigenous yellow cattle	823.86±74. 21 ^d	380.38±55. 66 ^{Ac}	365.30±61.8 2 ^{Abc}	253.96±21.7 8 ^{Aa}	292.06±35.8 1 ^{Aab}	264.60±22.9 5 ^{Aa}
犏牛 Cattle yak	830.11±69. 17 ^c	570.45±38. 70 ^{Bb}	578.35±11.3 3 ^{Bb}	478.68±16.6 1 ^{Ba}	475.57±51.5 3 ^{Ba}	562.96±34.4 8 ^{Cb}
尿素氮 UN/(mmol/L)						
西杂牛 Simmental crossbred cattle	2.17±0.26 ^C a	2.60±0.51 ^{Ba} b	2.83±0.43 ^{ab}	2.96±0.67 ^b	2.92±0.76 ^{Bb}	2.72±0.46 ^{Bab}
地方黄牛 Indigenous yellow cattle	1.93±0.15 ^B a	2.37±0.32 ^A Bb	2.84±0.23 ^c	2.74±0.37 ^c	2.33±0.21 ^{Ab}	2.19±0.16 ^{Aab}
犏牛 Cattle yak	1.60±0.22 ^A a	2.00±0.26 ^{Aa} b	2.34±0.42 ^{bc}	2.80±0.70 ^{cd}	2.91±0.51 ^{Bcd}	3.10±0.54 ^{Bd}
肌酐 CRE/(μmol/L)						
西杂牛 Simmental crossbred cattle	135.00±10. 7 ^a	144.67±14. 11 ^a	169.83±25.9 1 ^b	180.33±20.1 9 ^{ABb}	181.33±15.8 1 ^{ABb}	181.33±19.0 0 ^{ABb}
地方黄牛 Indigenous yellow cattle	135.20±6.9 4 ^a	133.40±10. 11 ^a	171.60±17.9 7 ^b	161.40±11.5 7 ^{Ab}	170.00±5.61 Ab	163.60±13.9 0 ^{Ab}
犏牛 Cattle yak	136.80±14. 62 ^a	140.80±15. 90 ^a	167.20±27.1 1 ^b	193.20±15.9 3 ^{Bc}	193.40±6.35 Bc	201.80±18.9 9 ^{Bc}

3 讨 论

3.1 热应激对肉牛直肠温度和呼吸频率的影响

我国南方地区夏季高温高湿，肉牛极易处于热应激状态，对其生产性能、健康状况造成不利影响^[1,14]。本试验于四川省降水最多的地域雅安市进行，夏季闷热潮湿。本研究发 5—8 月牛舍 THI 均高于 72，肉牛处于热应激环境下，而 4 和 9 月牛舍 THI 低于 72，肉牛处于非热应激环境下。

在适宜环境温度下，牛呼吸频率为 20~40 次/min，体温为 38.5 ℃左右。热应激状态下肉牛通过增加呼吸频率来增加蒸发散热^[15]，本研究中热应激状态下各试验牛呼吸频率较直肠温度先升高，说明当呼吸代偿仍不能有效缓解环境温度对机体的影响时肉牛体温才会升高。试验期间 5 月时各试验牛呼吸频率即显著升高，说明 5 月肉牛即进入热应激状态。试验期内犏牛呼吸频率和直肠温度均显著高于西杂牛和地方黄牛，说明犏牛热应激反应较西杂牛和地方黄牛严重且可能 4 月已处于热应激状态，推测是因为犏牛属高原牛种且带有牦牛血统，被毛较西杂牛和地方黄牛厚，阻碍了体表的辐射散热；此外，犏牛源自我国气候偏冷、长冬无夏西北高原地区，因而南方地区高温高湿对犏牛造成了较严重的热应激。7、8 月时地方黄牛直肠温度显著低于西杂牛和犏牛，说明地方黄牛体温受环境影响较小，抗热应激能力强于西杂牛和犏牛。

3.2 热应激对肉牛生产性能和营养物质表观消化率的影响

在热应激状态下，动物通过降低采食量降低机体热增耗以维持机体热平衡^[16]，这将导致动物生产性能降低甚至是负增长。而本研究中，试验期间各试验牛 DMI 并未降低，且 9 月西杂牛、地方黄牛和犏牛 DMI 相对于 4 月分别增加了 65.01%、37.83%和 33.89%，推测是本试验牛只为处于生长发育快速时期的青年牛，因热应激减少的采食量小于肉牛因生长发育需要而增加的采食量^[17]。当采用单位体重 DMI 来评价热应激对肉牛采食量的影响时，可发现西杂牛、地方黄牛和犏牛单位体重 DMI 均是 6 月最低，较热应激发生前分别降低了 11.17%、8.83%和 16.15%，由此可知热应激对地方黄牛采食量的影响要小于西杂牛和犏牛，对犏牛采食量影响最大。

西杂牛和犏牛 ADG 在热应激状态下出现不同程度降低，与前人研究结果^[18]一致。西杂牛、地方黄牛和犏牛 6 月 ADG 最低且较热应激发生前分别降低了 27.62%、10.81%和 46.15%，说明热应激对地方黄牛 ADG 影响小于西杂牛和犏牛，对犏牛 ADG 影响最大。结合 THI 变化和单位体重 DMI 可发现，各试验牛 6 月受热应激影响较大，采食量降低导致 ADG 降低。试验期间西杂牛 ADG 均高于地方黄牛和犏牛，说明西杂牛生产性能优于地方黄牛和犏牛。

热应激状态下肉牛大量血液被分配到体表帮助散热而使得消化道血流量减少，导致营养物质表观消化率降低^[19-20]。本试验中，夏季西杂牛 CP、EE、Ca 和 P 的表观消化率受热应激影响而降

低；但地方黄牛仅 CP 的表观消化率受热应激影响而降低；而犏牛 CP、EE、NDF、ADF、Ca 和 P 的表观消化率均有所降低，说明同样环境条件下热应激对地方黄牛营养物质表观消化率影响较西杂牛和犏牛小。各试验牛 CP 的表观消化率均因热应激而降低，推测是因为动物机体摄入蛋白质后的热增耗较其他营养物质高^[21]，CP 表观消化率降低可降低肉牛内源性产热。此外，试验期间地方黄牛 ADF 的表观消化率高于西杂牛和犏牛，说明地方黄牛更耐粗饲。

3.3 热应激对肉牛血液生化指标的影响

血清代谢物是反映机体代谢变化的敏感指标。Scharf 等研究发现，肉牛血清中 GLU 浓度在急性热应激时会升高，而在慢性热应激时则降低^[22]。本试验中，试验牛的热应激状态是在自然条件下随本地区季节、气候变化而变化的，属于慢性热应激。6 月各试验牛血清中 GLU 浓度最低，说明其通过利用 GLU 供能加快外周循环以增强机体散热^[23]；随着热应激时间的持续，肉牛血清中 GLU 浓度逐渐升高，推测是因为糖异生作用加强以维持血糖浓度稳定，增强机体对热应激的抵抗力^[24]。与西杂牛、地方黄牛相比，犏牛血清中 GLU 浓度下降出现的较早，5 月血清中 GLU 浓度即显著降低，说明犏牛对热应激更加敏感。

大量研究发现，热应激有增加机体脂肪沉积的趋势^[25-27]。本研究中，肉牛在热应激状态下血清中 TG 浓度升高而 NEFA 浓度降低，说明热应激使肉牛脂肪合成代谢加强，这与前人研究发现的热应激抑制泌乳早期奶牛血清中 NEFA 浓度升高的结果^[23,28]相似。这可能是血清中 NEFA 浓度降低可减少细胞线粒体基质的氧化分解反应，减少内源性产热和活性氧化物的产生，减缓热应激带来的副作用^[29-31]。地方黄牛和犏牛血清中 NEFA 浓度降低较西杂牛发生早且地方黄牛热应激期内血清中 NEFA 浓度显著低于犏牛，说明犏牛和地方黄牛对热应激较西杂牛敏感且地方黄牛内源性产热低于犏牛。

热应激时动物 DMI 的下降会使得糖原的储存量减少，血糖浓度需要糖异生作用来维持^[32]。在这种情况下，氨基酸代谢的增加会使血清中 UN 浓度增加。而 CRE 是由动物机体肌肉蛋白质水解产生的，其浓度主要与动物机体肌肉总量有关^[33]。本试验中，西杂牛、地方黄牛和犏牛血清中 UN 浓度在热应激期内显著升高，推测可能是热应激状态下各肉牛单位体重 DMI 降低使得机体糖原储存量减少，导致血糖浓度需要通过氨基酸糖异生作用来维持^[32]。热应激发生前犏牛血清中 UN 浓度显著低于西杂牛和地方黄牛，说明犏牛氮利用效率高于西杂牛和地方黄牛^[34]。而热应激结束后西杂牛、地方黄牛和犏牛血清中 UN 浓度较热应激发生前分别升高了 25.35%、13.47% 和 93.75%，说明热应激对犏牛氨基酸代谢影响较大。试验期间各试验牛血清中 CRE 浓度随着热应激时间的持续而逐渐升高，可能是由于各试验牛处于生长发育迅速的青年时期，其肌肉总量逐

渐增加。但 7、8、9 月犏牛血清中 CRE 浓度高于西杂牛和地方黄牛，但其试验期间增重较西杂牛和地方黄牛少，说明热应激使得犏牛肌肉蛋白质水解增加，氨基酸代谢加强，使得血清中 UN 浓度持续升高，这与其 ADG 的降低密切相关^[35]。

4 结 论

热应激状态下西杂牛、地方黄牛和犏牛的呼吸频率和直肠温度升高，生产性能和营养物质表观消化率降低。地方黄牛的耐热应激能力强于西杂牛和犏牛，犏牛对热应激最敏感，且热应激降低了犏牛的氮利用效率。

参考文献:

- [1] 王祖新,王之盛,王立志,等.不同季节温湿度指数对奶牛生产性能和生理生化指标的影响[J].中国畜牧杂志,2009,45(23):60–63.
- [2] LEFCOURT A M,ADAMS W R.Radiotelemetry measurement of body temperatures of feedlot steers during summer[J].Journal of Animal Science,1996,74(11):2633–2640.
- [3] MADER T L,DAVIS M S,BROWN-BRANDL T.Environmental factors influencing heat stress in feedlot cattle[J].Journal of Animal Science,2006,84(3):712–719.
- [4] ST-PIERRE N R,COBANOV B,SCHNITKEY G.Economic losses from heat stress by us livestock industries 1[J].Journal of Dairy Science,2003,86(Suppl.1):E52–E77.
- [5] YOUSEF M K,JOHNSON H D.Calorigenesis of dairy cattle as influenced by thyroxine and environmental temperature[J].Journal of Animal Science,1966,25(1):150–156.
- [6] BOHMANOVA J,MISZTAL I,COLE J B.Temperature-humidity indices as indicators of milk production losses due to heat stress[J].Journal of Dairy Science,2007,90(4):1947–1956.
- [7] ARMSTRONG D V.Heat stress interaction with shade and cooling[J].Journal of Dairy Science,1994,77(7):2044–2050.
- [8] SILANIKOVE N.Effects of heat stress on the welfare of extensively managed domestic ruminants[J].Livestock Science,2000,67(1/2):1–18.
- [9] COLLIER R J,COLLIER J L,RHOADS R P,et al.Invited review:genes involved in the bovine heat stress response[J].Journal of Dairy Science,2008,91(2):445–454.
- [10] LEE D G K.Climatic stress indices for domestic animals[J].International Journal of Biometeorology,1965,9(1):29–35.
- [11] JOHNSON J S,SCHARF B,WEABER R L,et al.Patterns of heat response and adaptation on summer pasture:a comparison of heat-sensitive (Angus) and-tolerant (Romosinuano) cattle[J].Journal of Thermal Biology,2012,37(4):344–350.
- [12] VAN KEULEN J,YOUNG B A.Evaluation of acid-insoluble ash as a natural marker in ruminant digestibility studies[J].Journal of Animal Science,1977,44(2):282–287.
- [13] 张丽英.饲料分析及饲料质量检测技术[M].2 版.中国农业大学出版社,2003.
- [14] COLLIER R J,BEEDE D K,THATCHER W W,et al.Influences of environment and its modification on dairy animal health and production[J].Journal of Dairy Science,1982,65(11):2213–2227.
- [15] EIGENBERG R A,BROWN-BRANDL T M,NIENABER J A,et al.Dynamic response indicators of heat stress in shaded and non-shaded feedlot cattle,part 2:predictive relationships[J].Biosystems Engineering,2005,91(1):111–118.
- [16] DERNO M,JENTSCH W,SCHWEIGEL M,et al.Measurements of heat production for estimation of maintenance energy requirements of Hereford steers[J].Journal of Animal Science,2005,83(11):2590–2597.

- [17] BURROW H M, PRAYAGA K C. Correlated responses in productive and adaptive traits and temperament following selection for growth and heat resistance in tropical beef cattle[J]. *Livestock Production Science*, 2004, 86(1/2/3): 143–161.
- [18] O'BRIEN M D, RHOADS R P, SANDERS S R, et al. Metabolic adaptations to heat stress in growing cattle[J]. *Domestic Animal Endocrinology*, 2010, 38(2): 86–94.
- [19] KADZERE C T, MURPHY M R, SILANIKOVE N, et al. Heat stress in lactating dairy cows: a review[J]. *Livestock Production Science*, 2002, 77(1): 59–91.
- [20] BERNABUCCI U, LACETERA N, DANIELI P P, et al. Influence of different periods of exposure to hot environment on rumen function and diet digestibility in sheep[J]. *International Journal of Biometeorology*, 2009, 53(5): 387–395.
- [21] TASAKI I, KUSHIMA M. Heat production when single nutrients are given to fasted cockerels[M]//MOUNT L E. *Energy metabolism*. Amsterdam: Elsevier, 1980: 253–256.
- [22] SCHARF B, CARROLL J A, RILEY D G, et al. Evaluation of physiological and blood serum differences in heat-tolerant (Romosinuano) and heat-susceptible (Angus) *Bos taurus* cattle during controlled heat challenge[J]. *Journal of Animal Science*, 2010, 88(7): 2321–2336.
- [23] WHELOCK J B, RHOADS R P, VANBAALE M J, et al. Effects of heat stress on energetic metabolism in lactating Holstein cows[J]. *Journal of Dairy Science*, 2010, 93(2): 644–655.
- [24] 刘铀, 林红英, 罗东君, 等. 热应激对肉鸡血液生化指标及内分泌机能的影响[J]. *湛江海洋大学学报*, 1999, 19(1): 61–64.
- [25] 王启军. 高温环境对不同生长阶段北京油鸡脂肪沉积及脂质代谢的影响[D]. 硕士学位论文. 杨凌: 西北农林科技大学, 2006.
- [26] 李洁蕾, 杨培歌, 冯跃进, 等. *L*-肉碱对热应激大鼠机体脂质代谢的影响[J]. *动物营养学报*, 2015, 27(9): 2849–2855.
- [27] KOUBA M, HERMIER D, LE DIVIDICH J. Influence of a high ambient temperature on lipid metabolism in the growing pig[J]. *Journal of Animal Science*, 2001, 79(1): 81–87.
- [28] RHOADS M L, RHOADS R P, VANBAALE M J, et al. Effects of heat stress and plane of nutrition on lactating Holstein cows: I. Production, metabolism, and aspects of circulating somatotropin[J]. *Journal of Dairy Science*, 2009, 92(5): 1986–1997.
- [29] BERNABUCCI U, LACETERA N, BAUMGARD L H, et al. Metabolic and hormonal acclimation to heat stress in domesticated ruminants[J]. *Microchemical Journal*, 2010, 4(7): 1167–1183.
- [30] BAUMGARD L H, RHOADS R P. Effects of heat stress on postabsorptive metabolism and energetics[J]. *Annual Review of Animal Biosciences*, 2013, 1(2): 311–337.
- [31] ZHANG F J, WENG X G, WANG J F, et al. Effects of temperature-humidity index and chromium supplementation on antioxidant capacity, heat shock protein 72, and cytokine responses of lactating cows[J]. *Journal of Animal Science*, 2014, 92(7): 3026–3034.
- [32] BAIRD G D, HEITZMAN R J, HIBBITT K G. Effects of starvation on intermediary metabolism in the lactating cow. A comparison with metabolic changes occurring during bovine ketosis[J]. *Biochemical Journal*, 1972, 128(5): 1311–1318.
- [33] ASAI H, HAYASHI N, TAKAI N, et al. Estimation of daily urinary potassium excretion using urinary creatinine as an index substance in prepartum dairy cows[J]. *Animal Science Journal*, 2005, 76(1): 51–54.
- [34] WANG H, LONG R, ZHOU W, et al. A comparative study on urinary purine derivative excretion of yak (*Bos grunniens*), indigenous cattle (*Bos taurus*), and crossbred (*Bos taurus* × *Bos grunniens*) in the Qinghai Tibetan plateau, China[J]. *Journal of Animal Science*, 2009, 87(7): 2355–2362.
- [35] RHOADS R P, O'BRIEN M D, GREER K, et al. Consequences of heat stress on the profile of skeletal muscle gene expression in beef cattle[J]. *The FASEB Journal*, 2008, 22(S1): 1165.1

Effects of Heat Stress on Performance, Nutrient Apparent Digestibility and Blood Biochemical Indices of Different Breeds of Young Beef Cattle[†]

PU Qijian WANG Zhisheng* PENG Quanhui ZHANG Can JING Xiaoping HU Rui ZOU

Huawei

(Animal Nutrition Institute of Sichuan Agricultural University, Key Laboratory of Low Carbon Culture and Safety Production in Cattle in Sichuan, Ya'an 625014, China)

Abstract: This experiment was conducted to investigate the effects of heat stress on performance, nutrient apparent digestibility and blood biochemical indices of different breeds of young beef cattle. Six individuals of Simmental crossbred cattle (Simmental × Xuanhan), indigenous yellow cattle (*Xuanhan* yellow cattle) and cattle yak (*Maiwa* yak × Jersey cattle) were chosen based on similar body weight [(185.89±14.02) kg]. Animals were fed with the same diet and feeding experiment lasted 187 days, including 7-days adaption period and 180-days test period. The experiment from April 2015 to September 2015. The results showed as follows: 1) the temperature humidity index (THI) of barn was above 72 from May to August and this satge belonged to heat stress (HS) period, and the THI of HS were higher than April (pre HS) and September (after HS) ($P<0.05$). During the HS period, the respiratory frequency and rectal temperature were significantly increased ($P<0.05$) for all experimental animals. The respiratory frequency and rectal temperature of cattle yak was significantly higher than those of Simmental crossbred cattle and indigenous yellow cattle in the period of experiment ($P<0.05$). 2) The dry matter intake per body weight of Simmental crossbred cattle, indigenous yellow cattle and cattle yak was decreased in HS period, and the lowest value in June and significantly lower than April ($P<0.05$), the degree of decreased was cattle yak>Simmental crossbred cattle>indigenous yellow cattle. The lowest values of average daily gains of Simmental crossbred cattle, indigenous yellow cattle and cattle yak were all in June, and decreased by 27.62% ($P<0.05$), 10.81% ($P>0.05$) and 46.15% ($P<0.05$) as contrasted April, respectively. The average daily gain of Simmental crossbred cattle was significantly higher than that of cattle yak from April to July ($P<0.05$). The highest values of feed/gain of Simmental crossbred cattle and cattle yak in June, and increased by 63.01% ($P<0.05$) and 89.03% ($P<0.05$) as contrasted April, respectively; the highest value of feed/gain of indigenous yellow cattle in September, and increased by 53.12% as contrasted to April ($P<0.05$). 3) The apparent digestibility of

*Corresponding author, professor, E-mail: zswangsicau@126.com (责任编辑 菅景颖)

crude protein (CP) of Simmental crossbred cattle, indigenous yellow cattle and cattle yak was different degrees of reduction in HS period and significantly decreased in July compared with April ($P<0.05$). The apparent digestibility of ether extract (EE) of Simmental crossbred cattle was significantly decreased in July compared with April ($P<0.05$), but the HS had no significant effects on the apparent digestibility of EE for indigenous yellow cattle and cattle yak ($P>0.05$). The apparent digestibility of neutral detergent fiber (NDF) (June) and acid detergent fiber (ADF) (from May to August) of cattle yak was significantly decreased in HS period compared with pre HS ($P<0.05$). The apparent digestibility of calcium (Ca) of Simmental crossbred cattle (from June to August) and cattle yak (from May to August) was significantly decreased in HS period compared with pre HS ($P<0.05$), and the apparent digestibility of phosphorus (P) of Simmental crossbred cattle (from June to July) and cattle yak (from May to August) was significantly decreased in HS period compared with pre HS, too ($P<0.05$). During the experiment period, the apparent digestibility of CP had no significant difference among the three breeds of young beef cattle ($P>0.05$), the apparent digestibility of EE of Simmental crossbred cattle and indigenous yellow cattle was significantly higher than that of cattle yak ($P<0.05$), the apparent digestibility of ADF of indigenous yellow cattle was significantly higher than that of Simmental crossbred cattle and cattle yak ($P<0.05$), and the apparent digestibility of P of Simmental crossbred cattle and indigenous yellow cattle was significantly higher than that of cattle yak ($P<0.05$). Moreover, the apparent digestibility of Ca of indigenous yellow cattle was significantly higher than that of cattle yak from May to September ($P<0.05$). 4) Serum glucose (GLU) concentration of Simmental crossbred cattle, indigenous yellow cattle and cattle yak had the lowest value in June and decreased by 16.82% ($P<0.05$), 12.82% ($P>0.05$) and 15.90% ($P<0.05$) compared with April, respectively. For all the experimental cattle, the non-esterified fatty acid (NEFA) concentration had the lowest value in July and significantly lower than that in April ($P<0.05$). Serum urea nitrogen (UN) concentration of Simmental crossbred cattle and indigenous yellow cattle was increased at first and then decreased in the experiment period with the age increasing, while the serum UN concentration of cattle yak was continually increased. Serum creatinine (CRE) concentration of all experimental animals in June to September was significantly higher than that in April and May ($P<0.05$), and the serum CRE concentration of cattle yak was significantly higher than that of indigenous yellow cattle from July to September ($P<0.05$). In conclusion, the performance and apparent digestibility of nutrients of different breeds of young beef

397 cattle are decreased under heat stress condition. Indigenous yellow cattle are more tolerance of heat
398 stress than Simmental crossbred cattle and cattle yak, and cattle yak are more sensitive to heat stress.

399 Key words: heat stress; beef cattle; performance; nutrient apparent digestibility; blood biochemical
400 indices

401

402